GRUPO Y FACTOR RH SANGUINEO		
GRUPO SANGUINEO	" A "	
METODO:AglutinaciÃ³n ABO		
FACTOR Rh - Anti D	Negativo	
METODO:Mezcla de Ac. Monoclonales IgG/IgM (BLEND)		
GLUCEMIA	0,79 g/l	0,70 a 1,00 g/l
METODO:ColorimÃ©trico		
UREMIA	0,39 g/l	0,10 a 0,50 g/l
METODO:GinÃ©tico UV optimizado		
HEPATOGRAMA		
COLESTEROL TOTAL	138 mg/dl	SegÃºn NCEP: Deseable: menor a 200 mg/dl Limite: 200 - 240 mg/dl Alto: mayor a 240 mg/dl
METODO:CinÃ©tico colesterol esterasa-oxidasa		
ASPARTATOAMINOTRANSFERASA - AST - TGO	27 U/l	Hasta 38 U/l
METODO:CinÃ©tico UV 37 Â°C optimizado - IFCC		
ALANINOAMINOTRANSFERASA - ALT - TGP	36 U/l	Hasta 40 U/l
METODO:CinÃ©tico UV 37 Â°C optimizado - IFCC		
FOSFATASA ALCALINA	68 U/l	65 a 300 U/l
METODO:CinÃ©tico optimizado (DGKC y SSCC)		
BILIRRUBINA TOTAL	0,68 mg/dl	Hasta 1,00 mg/dl
METODO:ColorimÃ©trico - DPD		
BILIRRUBINA DIRECTA	0,05 mg/dl	Hasta 0,30 mg/dl
METODO:ColorimÃ©trico - DPD		
BILIRRUBINA INDIRECTA	0,63 mg/dl	Hasta 0,70 mg/dl
METODO:CÃ¡lculo		
COLESTEROL HDL	50 mg/dl	40 a 120 mg/dl
METODO:ColorimÃ©trico enzimÃ¡tico homogÃ©neo		
COLESTEROL LDL	78 mg/dl	Valores guÃa para evaluar riesgo de cardiopatÃa coronaria en adulto: Optimo: menor 100 mg/dl LÃmite: 100 - 159 mg/dl Alto: 160 - 189 mg/dl Muy alto: mayor o igual 190 mg/dl
METODO:ColorimÃ©trico enzimÃ¡tico homogÃ©neo		

Dr Varesco Andres Ricardo
Bioquimico
MP 443

Escaneado con CamScanner